



បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំសណ្តែកបាយ



សណ្តែកបាយជាដំណាំមួយដែលចាត់ថ្នាក់ក្នុងពពួកដំណាំសណ្តែក Leguminosea ។ សណ្តែកបាយ មានពីរប្រភេទ គឺប្រភេទដែលមានសំបកផ្លែពណ៌ខ្មៅនៅពេលទុំ (*Vigna mungo* = black gram) និងប្រភេទដែលមានសំបកផ្លែពណ៌ប្រផេះនៅពេលទុំ (*Vignaradiata* = mungbean) ។

សណ្តែកបាយមានសារប្រយោជន៍ច្រើនសំរាប់ធ្វើជាចំណីអាហាររបស់មនុស្ស និងជាប្រភពចំណូលដី សំខាន់ ។ សណ្តែកបាយជាដំណាំដែលអាចទាញយកអាសូតពីបរិយាកាសដោយខ្លួនឯង និងជួយ បង្កើនជីជាតិដី ។ ប្រជាកសិករនិយមដាំដំណាំនេះនៅក្រោយពេលប្រមូលផលស្រូវរួច ជាពិសេស គេអាចដាំដុះវានៅតាមតំបន់មាត់ទន្លេ និងតំបន់ខ្ពង់រាប ។ ផ្ទៃដីដាំដុះសណ្តែកបាយសរុបនៅប្រទេស កម្ពុជាគឺ ៤៤.៩៤០ហិ.ត ដែលក្នុងនោះនៅរដូវវស្សាមានផ្ទៃដីដាំដុះ ៣៣.០១០ហិ.ត និងរដូវប្រាំង

១១.៩៣០ហិ.ត ។ ទិន្នផល មធ្យមប្រចាំឆ្នាំគឺ ០.៧៣៤ត/ហិ.ត (រដូវវស្សា ០.៧៤៤ត/ហិ.ត រីឯរដូវប្រាំង ០.៧០៥ត/ហិ.ត) (ស្ថិតិកសិកម្ម ២០០៣-២០០៤ របស់ការិយាល័យស្ថិតិនៃ នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ) ។

១. ការជ្រើសរើសទីកន្លែង និងការរៀបចំដី

ដំណាំសណ្តែកបាយអាចដុះលូតលាស់លើដីជាច្រើនប្រភេទ តែប្រជាកសិករខ្លះនិយមដាំដំណាំនេះនៅលើដីតាមតំបន់ខ្ពង់រាប (ឡាបានស្បែក និង កំពង់ស្បែក) និងតំបន់តាមមាត់ទន្លេ (ដីកៀនស្វាយ) ។ ការរៀបចំដីមានសារសំខាន់ណាស់ដើម្បីឱ្យដីមានលក្ខណៈសមស្របឱ្យដំណាំអាចដុះលូត លាស់បានល្អ ។ ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្ររៀបចំដីអាចមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាដោយយោងទៅតាមតំបន់ដាំដុះ រដូវកាលដាំដុះ ប្រភេទដី ឬលទ្ធភាព ជាក់ស្តែងរបស់កសិករ ។ ការភ្ជួររាស់ដីបានល្អ និងនាំឱ្យទិន្នផលកើនឡើងខ្ពស់ ។ យោងទៅតាមរដូវកាល និងតំបន់ដាំដុះ គេអាចអនុវត្តការរៀបចំដីដូច ខាងក្រោម :

- តំបន់ខ្ពង់រាប (ក្រុមដីឡាបានស្បែក និងកំពង់ស្បែក) : គេភ្ជួរដីពីរលើក ដោយភ្ជួរលើកទីមួយរយៈពេលមួយខែមុនដាំនៅជំរៅ ២០ស.ម លើកទីពីរគឺភ្ជួរនៅមុនពេលរៀបចំដីតែម្តង ជាទូទៅច្រើនតែបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ដែលបរិមាណសំណើមក្នុងដីអាចឱ្យដំណាំលូតលាស់បាន ។ បន្ទាប់ពីភ្ជួរលើកទី២ ហើយគេហាលដីចោលមួយថ្ងៃរួចរាស់បំបែកដីឱ្យបានម៉ត់ចតុរសម បន្ទាប់មកទៀតទើបគេធ្វើការដាំដុះតែម្តង ។
- តំបន់ទន្លេ (ក្រុមដីកៀនស្វាយ) : ការភ្ជួររាស់អាចប្រព្រឹត្តទៅមួយដង ឬពីរដង អាស្រ័យទៅតាមសំណើមដីច្រើន ឬតិច ។ ចំពោះការដាំនៅរដូវ សំរក ការទុកចន្លោះពេលហាលដីចោល ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីភ្ជួរលើកទី១ គឺជាការសមស្របដែលអាចជៀសវាងការបាត់បង់សំណើមដី ។

២. ការជ្រើសរើសពូជ និងការរៀបចំគ្រាប់ពូជ

ត្រូវជ្រើសរើសពូជសណ្តែកបាយណាដែលផលទ្រាំទៅនឹងជំងឺ សត្វល្អិត និងមានទិន្នផលខ្ពស់ ចំណែកគ្រាប់ពូជដែលយកមកដាំត្រូវមានអត្រា ដំណុះខ្ពស់ និងជាគ្រាប់ពូជសុទ្ធល្អផងដែរ ។ ចំពោះដីដែលខ្វះជាតិអាសូត គេត្រូវប្រឡាក់គ្រាប់ជាមួយម្សៅ Rhizobium ដើម្បីជួយជំរុញដល់ការចាប់យក អាសូត ។ មុនពេលដាំយើងត្រូវជ្រើសរើសគ្រាប់ឱ្យបានល្អ ជៀសវាងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃ និងជម្ងឺ ។ ការដាំជាជួរត្រូវការគ្រាប់ ១៥-២០គក/ហិ.ត ចំណែកការដាំដោយចាចគ្រាប់គេត្រូវការគ្រាប់ ៣០-៤០គក/ហិ.ត ។

៣. វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

រដូវកាលដាំដុះ: នៅតំបន់ខ្ពង់រាបគេនិយមដាំនៅដើមរដូវវស្សាតែមួយដងប៉ុណ្ណោះ គឺចាប់ពីដើមខែមេសាដល់ដើមខែឧសភា ហើយប្រមូលផលនៅ ចុងខែមិថុនាដល់ដើមខែកក្កដា បន្ទាប់ពីនោះគេដាំសណ្តែកស្បែង ។ ចំណែកតំបន់មាត់ទន្លេវិញគេអាចដាំជាពីរដំណាក់កាល គឺលើកទីមួយនៅខែកក្កដា- សីហា និងលើកទីពីរចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា-ធ្នូ ។

