



រលាកស្រូបស្រូវ

រលាកស្រូបស្រូវគឺជាអ្វី?

គឺជាជំងឺស្រូវម្យ៉ាងដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងារចំលងរបស់ផ្សិតឈ្មោះ *Rhizoctonia solani* ។

តើវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម្តេច?

ជាទូទៅ យើងអាចសង្កេតឃើញរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះចាប់ផ្តើមលេចចេញនៅដំណាក់កាលបែកគុម្ព រហូតដល់ដាក់ទឹកដោះ ។ ពោល គឺមានស្នាមអុចដាមជាប់នៅលើស្រទាប់នៃដើមស្រូវដែលមានទំហំ ១-៣សម រាងជារង្វង់ពងក្រពើ មានពណ៌ប្រផេះ និងនៅលើស្លឹក, កូរស្រូវមាន ស្នាមអុចពណ៌ប្រផេះនៅចំណុចកណ្តាល ហើយនៅតែមនៃចំណុចមាន ពណ៌ត្នោត ។



តើវាវាលចាលយ៉ាងម្តេច?

ជំងឺនេះវាលដាលខ្លាំងនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅ និងមានសំណើមខ្ពស់ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះការប្រើជីអាសូតលើសកំរិត និងស្នូងរីព្រោះមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ គឺជាមូលហេតុធ្វើអោយជំងឺមានការរីករាលដាលខ្លាំង ។

តើបច្ចុប្បន្នវាកើតមាននៅតំបន់ណាខ្លះ?

បច្ចុប្បន្ននេះវាកើតមាននៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ។ ដូចជានៅប្រទេសហ្វីលីពីន, ឥណ្ឌា, ជប៉ុន, ចិន, វៀតណាម, ថៃ, កម្ពុជា ។ល។

តើមានវិធានការអ្វីខ្លះបើឱ្យធ្វើការកំចាត់?

• វិធានការមធ្យម

- ១. ក្រោយពេលប្រមូលផលរួចចាំបាច់ត្រូវធ្វើការភ្ជួរដី និងត្រូវធ្វើការដាក់ជីកំប៉ុសទ្រាប់បាត ហើយត្រូវធ្វើការដាក់ជីគីមី (NPK) អោយបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកំរិតណែនាំ នៃប្រភេទដី ។
- ២. ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរកពូជដែលមានសុខភាពល្អ (ដោយអុំ, ស្លែ ឬ ដោយសូលុយយ៉ុងទឹកអំបិល) ។
- ៣. បើសិនជាយើងសង្កេតឃើញមានវត្តមាននៃជំងឺរលាក់ស្រទាប់នៅលើគ្រាប់ស្រូវ យើងត្រូវធ្វើការ ប្រឡាក់ថ្នាំពុលកសិកម្ម (ថ្នាំសំលាប់ផ្សិត Fungicide) មុនពេលយកទៅសាប រីឯព្រោះ ដោយត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកបច្ចេកទេស ផ្នែកការពារដំណាំ ។
- ៤. ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយនូវចំនួនដង់ស៊ីតេដើមស្រូវនៅក្នុងស្រែអោយបានសមស្រប និង ត្រូវធ្វើការបង្កូរទឹកចេញពីស្រែនៅដំណាក់កាលបែកគុម្ពអតិបរិមាណ៦២-៧ថ្ងៃ ។
- ៥. ត្រូវធ្វើការសំអាតស្មៅស្រែជាប្រចាំអោយបានស្អាត
- ៦. បើសិនជាជំងឺនេះមានការរីករាលដាលខ្លាំង ត្រូវធ្វើការដុតកញ្ចាំងក្នុងស្រែនោះចោល តែវិធានការនេះអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ មីក្រូសរីរាង្គ ដែលជាសារធាតុចាំបាច់សំរាប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ ។

• វិធានការកំចាត់

- ១. ត្រូវធ្វើការដកចោលជាបន្ទាន់នូវដើមស្រូវណាដែលទទួលរងនូវការបំផ្លាញពីជំងឺរលាក់ស្រទាប់ ។
- ២. ត្រូវធ្វើការបាញ់ថ្នាំពុលកសិកម្ម carbendazim 50WP (1g/l) អោយស្របតាមការណែនាំរបស់អ្នកបច្ចេកទេស ផ្នែកការពារដំណាំ ។