



## ពូជសណ្តែកបាយ "ស៊ីអឹមប៊ី៣"

ពូជសណ្តែកបាយ ស៊ីអឹមប៊ី៣ "CMB3" ត្រូវបានបញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី) នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាដើមឆ្នាំ ២០០៩ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរយៈ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ ATF 3944 នាំចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលី។

### លក្ខណៈពិសេសៗរបស់ពូជសណ្តែកបាយ "ស៊ីអឹមប៊ី ៣"

សណ្តែកបាយ "ស៊ីអឹមប៊ី៣" ចេញផ្ការយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ និងទុំប្រមូលផលលើកទីមួយរយៈពេល ៥០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំ។ ដើមដងមានពណ៌បៃតង រាងជ្រុងឈរត្រង់ កម្ពស់ដើមប្រែប្រួលពី ៥០-១០០ ស.ម បែកមែកពី ២-៤ មែក។ នៅលើដើម និងមែកមានរោមតូចៗឆ្មារ ។ ប្រព័ន្ធបូស មានបូសកែវ និងបូសរយាងដែលអាចចាក់ចូលទៅក្នុងដីជម្រៅ ពី ៥០-៦០ ស.ម ប៉ុន្តែ ៨០ ភាគរយ នៃប្រព័ន្ធបូសស្ថិតនៅជម្រៅពី ៥-២០ ស.ម។ នៅលើបូសមានកំពកបូសតូចៗ បង្កើតឡើងដោយវត្តមាននៃបាក់តេរីមួយចំនួនក្នុងពូកវិហ្សូប្យូម ដែលមានសមត្ថភាពស្រូប និងភ្ជាប់អាសូត (N) សេរីពីបរិយាកាស និងក្នុងដី ។ ទម្រង់ស្លឹកមានលក្ខណៈពិសេសងាយរលួយនៅក្នុងដីដែលជាប្រភពជីធម្មជាតិដ៏ប្រសើរសម្រាប់ដំណាំផ្សេងៗទៀត ។ ផ្កាជាកញ្ចុំ ពេលរីកមានពណ៌លឿង ផ្លែមានរាងជាស៊ីឡាំងមូលទ្រវែង ផ្លែខ្លីមានពណ៌បៃតងចាស់ និងផ្លែទុំមានពណ៌ខ្មៅ។ គ្រាប់មានពណ៌បៃតង ចំនួនផ្លែក្នុង ១ ដើមពី ១២-២០ ផ្លែ។ ចំនួនគ្រាប់ក្នុងមួយផ្លែពី ៧-១៤ គ្រាប់ ទម្ងន់ ១០០០ គ្រាប់ស្មើ នឹង ៦០ ក្រាម និងទិន្នផលជាមធ្យម ៨៥៣ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា និងមានសក្តានុពលទិន្នផល ១.៩០០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា។

### វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

ពូជសណ្តែកបាយនេះ អាចដាំដុះបានពេញមួយឆ្នាំនៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាបដោយបុកដាំជាជួរ ឬដាំតាមចង្កូរ និងដាំដោយព្រោះគ្រាប់ទៅលើដីដែលត្រូវរួច ហើយរាស់លុប។ ចំពោះការដាំដោយបុករណ្តៅជាជួរគួរប្រើគម្លាត គុម្ព ២៥-៣០ គុណនឹង ៣៥-៤០ ស.ម និងជម្រៅពី ២-៣ ស.ម ដោយក្នុងមួយរណ្តៅដាក់គ្រាប់ចំនួន ២-៣ គ្រាប់។ រីឯការដាំតាមតំបន់ទំនាបគឺដាំបន្ទាប់ពីច្រូតស្រូវរស្សរួច ត្រូវលើករងចំងាយពី គ្នាប្រហែល៣០ស.មមួយ និងមានកំពស់១០ទៅ ១៥ ស.ម។ ការដាំដុះពូជសណ្តែកបាយ "ស៊ីអឹមប៊ី៣" លើផ្ទៃដីមួយហិកតា គឺបើដាំដោយបុកដាំជាជួរត្រូវការគ្រាប់ពូជពី ១៥-២០ គ.ក្រ/ហា.ត និងបើដាំដោយព្រោះ ត្រូវការគ្រាប់ពូជពី ៣០-៤០ គ.ក្រ/ហា.ត។



ក្រោយពីដាំបាន ១០-១៥ ថ្ងៃ គួរកាត់រំលោះកូនដោយទុកតែដើមណាដែលឆ្កោស និងរឹងមាំល្អជាងគេចំនួន ១-២ ដើមក្នុងមួយគុម្ពនិងត្រូវដកស្មៅចង្រៃឲ្យបានស្អាត ចៀសវាងការដណ្តើមដីជាតិពីដំណាំដែលនាំឲ្យដំណាំដុះលូតលាស់យឺត។

**ការដុះលូតលាស់**

ការធ្វើដីបានផុសល្អ ដីមានដីជាតិសំណើមគ្រប់គ្រាន់ និងធាតុអាកាសអំណោយផលក្រោយពីដាំបាន ៣ ថ្ងៃ គ្រាប់ចាប់ផ្តើមដុះទូលដឹមកខាងលើ។ ចាប់ពីពេលដុះ ពន្លករហូតដល់អាយុ ១៥ ថ្ងៃ សណ្តែកមានការដុះលូតលាស់ពុំសូវលឿនប៉ុន្មានទេតែអាយុកាលចាប់ពី ២០ ថ្ងៃឡើងទៅសណ្តែកបាយមានការដុះលូតលាស់យ៉ាង លឿន។

ឈ្មោះដី	កម្រិតដីទៅតាមក្រុមដី (គ.ក្រ / ហ.ត)		
	ព្រៃខ្មែរ ប្រទះឡាន (ដីខ្សាច់-ល្បាយខ្សាច់)	កំពង់សៀម ទួលសំរោង (ដីល្បាយឥដ្ឋ)	កៀនស្វាយ (ដីល្បាយ)
ដេអាប៉េ	១០០	១១០	៨៥
ប៉ូតាស្យូម	៥០	៥០	៥៥

**ការប្រើប្រាស់ដី**

ការប្រើប្រាស់ដីតាមបច្ចេកទេស និងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលា ធ្វើឲ្យដំណាំដុះលូតលាស់ល្អទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ ដីដែលអាចប្រើប្រាស់គឺដីដេអាប៉េ និងប៉ូតាស្យូម។ ការប្រើប្រាស់ដី គឺដីដេអាប៉េ និងប៉ូតាស្យូម(១០០ភាគរយ) ដាក់ទ្រាប់បាតមុនពេលដាំ ១ ឬ ២។ ដីត្រូវដាក់ដោយកប់លប់ក្នុងដីជម្រៅ ៥-១០ ស.ម ការពារដីមិនឲ្យបាត់បង់តាមរយៈការហើរទៅក្នុងបរិយាកាស និងការហូរច្រោះដោយសារទឹកផង។ ចំពោះដីលាមកគោ ឬកំប៉ុស្ត កសិករអាចប្រើនៅពេលទ្រាប់បាតក្នុងកម្រិត ៥ គ/ហ.ត ឬ ០,៥ គ.ក្រ/ម<sup>២</sup> បន្ថែមលើដីគឺមី បើសិនជាដីរបស់គាត់ខ្វះសារធាតុសរីរាង្គ។

**ការប្រមូលផល**

ផ្លែសណ្តែកទុំអាចប្រមូលផលនៅរយៈពេល ២០ ថ្ងៃក្រោយចេញផ្កា (ចំនួនផ្លែលើសពី ៩០ ភាគរយ ចាប់ផ្តើមប្រែពណ៌ពីបៃតងក្រមៅទៅជាខ្មៅ)។ គេអាចប្រមូលផលបាន ២-៣ លើក ក្នុងមួយវដ្តជីវិតរបស់វា។ គម្លាតពេលប្រមូលផលពីមួយលើកទៅមួយលើកមានរយៈពេល ៥-៧ថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែការប្រមូលផលលើកទីបី ពុំសូវទទួលបានទិន្នផលច្រើនដូចលើកទីមួយ និងទីពីរទេ។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រមូលផលជាហេតុ ធ្វើឲ្យទិន្នផលមានការបាត់បង់ដោយសារផ្លែទុំប្រេះនាំឲ្យជ្រុះគ្រាប់នៅរដូវប្រាំង ឬគ្រាប់សណ្តែកអាចដុះនៅក្នុងផ្លែបើមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់យូរថ្ងៃនៅរដូវវស្សា។

**ការទុកដាក់ក្រោយប្រមូលផល**

ជាមធ្យមសំណើមគ្រាប់ក្រោយពេលប្រមូលផលពី ១៥-១៨ ភាគរយ ដូច្នេះតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការហាលសម្ងាត់បន្ថែមទៀតដោយកម្ដៅថ្ងៃ។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការហាលសម្ងាត់ក្រោយពេលប្រមូលផល និងការទុកដាក់គ្រាប់មិនបានត្រឹមត្រូវ គឺងាយរងការបំផ្លាញពីពពួកសត្វល្អិតចង្រៃដូចជាខ្នុតជាដើមដោយវាស៊ីចោះ ផ្នែកខាងក្នុងរបស់គ្រាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការ បាត់បង់ទាំងទិន្នផលគុណភាព និងតម្លៃ។

**ការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ**

ពូជសណ្តែកបាយ “ស៊ីអឹមបី៣” ជាពូជដែលមានស្ថេរភាពសេនេទិច និងអាចរក្សាទុកគ្រាប់ពូជដាំបានទៀតពី ២-៣ រដូវកាលប្រសិនបើ យើងធ្វើការបន្សុទ្ធពូជបានត្រឹមត្រូវ។ ការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ សម្រាប់ ប្រើប្រាស់នៅរដូវបន្ទាប់ គឺគ្រាប់ពូជត្រូវមានសំណើមពី ១២-១៣ ភាគរយ ហើយត្រូវរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលគ្មានសត្វល្អិត គ្មានខ្យល់ចេញចូល ឬទុកនៅក្នុងធុងបិទជិត ឬអាចរក្សាទុកដោយប្រើប្រាស់ ថ្នាំការពារសត្វល្អិត។



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សា មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងព័ត៌មាន ការិយាល័យផែនការ សហប្រតិបត្តិការ និងពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ៣ សង្កាត់ប្រទះឡាន ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមប្រអប់សំបុត្រលេខ ០១ ភ្នំពេញ  
 ទូរស័ព្ទលេខ: (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤ គេហទំព័រ: [www.cardi.org.kh](http://www.cardi.org.kh)  
 ទូរអគ្គី: [ssophany@cardi.org.kh](mailto:ssophany@cardi.org.kh) [trin@cardi.org.kh](mailto:trin@cardi.org.kh) [hunyadana@cardi.org.kh](mailto:hunyadana@cardi.org.kh)